

1. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями

При сложении (вычитании) дробей с одинаковыми знаменателями числители складывают (вычитают), а знаменатель оставляют тот же.

Примеры: а) $\frac{2}{11} + \frac{5}{11} = \frac{2+5}{11} = \frac{7}{11}$; б) $\frac{7}{8} - \frac{4}{8} = \frac{7-4}{8} = \frac{3}{8}$

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

Чтобы сложить (вычесть) дроби с разными знаменателями, надо:

- 1) привести данные дроби к наименьшему общему знаменателю
- 2) сложить (вычесть) полученные дроби (как в пункте 1)

Примеры: а) $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{10}{15} + \frac{9}{15} = \frac{19}{15} = 1\frac{4}{15}$; б) $\frac{3}{5} - \frac{4}{7} = \frac{21}{35} - \frac{20}{35} = \frac{1}{35}$

3. Сложение и вычитание смешанных чисел: для того, чтобы вычислить сумму (разность) смешанных дробей с равными знаменателями их всегда можно перевести в неправильные, далее выполнить необходимое действие. После этого если в результате получаем неправильную дробь переводим её в смешанную.

Примеры

$$6\frac{2}{13} + 4\frac{1}{13} = \frac{6 \cdot 13 + 2}{13} + \frac{4 \cdot 13 + 1}{13} = \frac{80}{13} + \frac{53}{13} = \frac{133}{13} = 10\frac{3}{13}$$

$$6\frac{2}{13} + 4\frac{1}{13} = 6 + \frac{2}{13} + 4 + \frac{1}{13} = 10\frac{3}{13}$$

$$13\frac{7}{9} - 4\frac{1}{9} = \frac{13 \cdot 9 + 7}{9} - \frac{4 \cdot 9 + 1}{9} = \frac{124}{9} - \frac{37}{9} = \frac{87}{9} = 9\frac{6}{9}$$

$$13\frac{7}{9} - 4\frac{1}{9} = 13 + \frac{7}{9} - \left(4 + \frac{1}{9}\right) = 13 + \frac{7}{9} - 4 - \frac{1}{9} = 13 - 4 + \left(\frac{7}{9} - \frac{1}{9}\right) = 9\frac{6}{9}$$

4. Умножение дробей

а) Чтобы умножить дробь на натуральное число, надо ее числитель умножить на это число, а знаменатель оставить без изменения

Примеры: $\frac{3}{4} \cdot 5 = \frac{3 \cdot 5}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

б) Чтобы умножить дробь на дробь, надо:

- 1) в числителе записать произведение числителей, в знаменателе – произведение знаменателей;
- 2) выполнить сокращение (если возможно);
- 3) выполнить умножение

Примеры: а) $\frac{4}{7} \cdot \frac{14}{5} = \frac{4 \cdot 14}{7 \cdot 5} = \frac{4 \cdot 2}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$; б) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} = \frac{3 \cdot 4}{8 \cdot 15} = \frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{10}$

в) Для того, чтобы выполнить умножение смешанных чисел, надо их записать в виде неправильных дробей, а затем воспользоваться правилом умножения дробей.

Примеры: $9\frac{3}{5} \cdot 1\frac{5}{12} = \frac{48}{5} \cdot \frac{17}{12} = \frac{48 \cdot 17}{5 \cdot 12} = \frac{4 \cdot 17}{5} = \frac{68}{5} = 13\frac{3}{5}$

5. Деление дробей

Чтобы разделить одну дробь на другую, надо делимое умножить на число, обратное делителю

Примеры: $2\frac{2}{5} : 1\frac{1}{15} = \frac{12}{5} : \frac{16}{15} = \frac{12}{5} \cdot \frac{15}{16} = \frac{12 \cdot 15}{5 \cdot 16} = \frac{3 \cdot 3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

